








Engels raai gras middeltijds doorschietend Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)		Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stof- opbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stof- opbrengst (relatief) gemiddelde van beweidingsproef- velden	Droge stof- opbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproefvelden	Droge stof- opbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweidings- en maaiproefvelden	
Rubricering 1)	Rasnaam									
Diploïde rassen	A	Arsenal 	23-5	8,2	7,0	8,0	102	103	103	103
	A	Abosan 1	30-5	8,3	7,2	8,7	96	101	104	102
	A	Calvano 1	24-5	8,1	6,8	7,3	105	105	102	104
	A	Toronto 	24-5	8,1	7,1	7,8	106	102	103	102
	A	Rodrigo	25-5	8,2	7,0	7,5	102	103	101	103
	A	Option	26-5	8,1	7,0	8,6	98	100	100	100
	A	Domiat 1	29-5	7,9	6,7	8,6	97	100	100	100
	A	Chicago	23-5	8,6	7,0	7,7	97	101	100	101
	B	Frisian 1	24-5	7,8	6,7	8,3	102	99	102	100
	B	Orantas	24-5	8,0	7,0	7,8	100	100	100	100
	B	Sibasa	25-5	8,0	6,9	8,3	99	99	100	99
	B	Gasata 1	1-6	8,1	7,0	8,2	92	98	101	99
	B	Honroso	29-5	8,3	7,1	7,9	89	101	98	100
	B	Barata	23-5	7,8	7,0	7,6	101	99	100	99
	B	Alvaro	26-5	8,1	7,0	7,8	97	99	99	99
	B	Mateon 1	2-6	8,2	7,1	7,8	85	99	98	99
B	Laguna	26-5	7,9	7,1	7,7	95	98	99	98	
B	Denver	30-5	8,1	7,0	7,5	93	98	98	98	
B	Maestro	31-5	8,1	6,7	8,2	87	97	97	97	
Tetraploïde rassen	A	Maurizio 	24-5	8,2	7,6	8,8	107	102	101	102
	A	Trivos 	25-5	7,7	6,8	8,9	102	99	102	100
	A	Pomposo 	25-5	7,9	7,5	8,6	99	100	100	100
	A	Channi 1	30-5	7,5	7,6	9,1	98	99	98	99
	A	Catabi 1	27-5	7,4	7,4	8,5	104	98	99	98
	A	Charlene	25-5	7,9	7,1	8,9	96	96	101	98
	A	Roy	25-5	8,1	7,2	7,9	101	98	99	98
	A	Cantalou	25-5	7,7	7,5	8,7	100	97	97	97
	B	Turmalin	30-5	8,2	7,6	8,6	95	98	97	97
	B	Barelan	1-6	8,1	7,6	8,9	92	97	97	97
	B	Modane	31-5	8,2	7,6	8,2	94	98	94	97
	B	Barnauta	28-5	8,0	7,8	8,0	99	96	98	97
	B	Elgon	1-6	7,7	7,5	7,9	93	97	96	97
	N	Besser	25-5	7,9	7,5	8,5	105	101	100	101
	N	Hurricane	30-5	8,0	7,2	8,9	101	101	98	100
	N	Novello	2-6	8,1	7,4	8,8	94	101	101	101
N	Ovambo 1	27-5	8,0	7,6	8,7	103	99	100	99	
N	Aventino	23-5	7,9	7,5	8,6	105	100	99	100	
Nieuw in Rassenlijst 2012										
N	Massimo	26-5	8,0	6,6	8,1	96	104	101	103	
	N	Diwan	27-5	7,8	7,6	8,8	107	105	102	104
	N	Binario	23-5	8,1	7,9	9,0	103	101	102	101
	N	Melverde	24-5	8,1	7,2	9,3	96	101	101	101

Engels raagrass laat doorschietend			Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stof- opbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stof- opbrengst (relatief) gemiddelde van beweidingsproef- velden	Droge stof- opbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproefvelden	Droge stof- opbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweidings- en maaiproefvelden
Rubricering 1)	Rasnaam									
Diploïde rassen	A	Romark	3-6	8,0	7,1	7,6	99	103	100	102
	A	Burlina 1	3-6	8,0	7,0	7,6	99	101	102	101
	A	Jalinas	3-6	8,1	6,8	7,6	103	100	101	100
	A	Candore	4-6	8,3	7,1	8,2	96	99	100	100
	A	Asturion	4-6	8,1	6,9	7,9	101	99	100	99
	A	Tomaso 	3-6	8,3	7,2	7,4	101	99	100	100
	A	Bakuri 1	6-6	8,1	7,5	8,4	96	97	100	98
	A	Astorga 	4-6	8,2	6,8	8,4	92	99	99	99
	B	Tornado	4-6	8,3	7,3	7,3	97	100	100	100
	B	Candia	3-6	8,3	7,0	7,6	98	99	98	99
	B	Cadans	8-6	8,0	7,4	8,1	92	96	97	96
	N	Humbi 1	5-6	7,8	7,2	8,2	98	102	99	101
N	Bovini	6-6	8,0	6,9	7,7	99	101	103	102	
N	Zenital	4-6	8,2	7,0	8,4	96	101	100	100	
Tetraploïde rassen	A	Polim	3-6	7,7	7,6	8,6	108	100	101	101
	A	Barpasto	3-6	8,1	7,9	8,4	105	100	99	100
	A	Alcander	4-6	7,9	7,5	9,0	101	98	101	99
	A	Como	7-6	7,5	7,4	8,2	99	100	102	100
	A	Barmaxima	4-6	7,9	7,7	7,4	100	101	99	100
	A	Bocage	4-6	8,1	7,7	9,2	100	96	97	96
	A	Herbal	5-6	7,8	7,3	8,1	98	98	99	98
	B	Barsaxo	4-6	8,3	7,6	8,1	99	97	96	97
	B	Cabriolet	7-6	7,6	7,0	8,9	97	96	96	96
	B	Altius	6-6	8,1	7,7	7,7	97	97	96	97
	B	Fornido	4-6	7,6	6,8	8,3	97	94	101	96
	B	Barsintra	9-6	7,9	7,7	9,0	94	92	98	94
	N	Rivaldo	3-6	8,1	7,5	8,8	103	101	102	101
	N	Meltador	6-6	8,2	7,3	8,8	104	102	100	102
N	Meracoli	4-6	7,9	7,6	8,8	105	103	98	101	

1) Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras.
Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

Bronvermelding: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2012.



Dit ras vindt u terug op www.mengselopmaat.nl

Aston Energy blijkt uit eigen onderzoek dezelfde roestresistentie en een vergelijkbare ds-opbrengst te hebben als het rassenlijstras Maurizio.
De wintervastheid is volgens eigen gegevens 6,6.